

**ПРИКЛАДИ РЕЦЕПТІВ НА ПРЕПАРАТИ, ЯКІ
РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ІСПИТУ З ФАРМАКОЛОГІЇ НА
ТРЕТЬОМУ КУРСІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ**

1. Засоби, що впливають на аферентну іннервацію

Rp.: Sol. Novocaini 2%-5 ml

D.t.d. N. 6 in ampull.

S. Для провідникової анестезії.

Rp.: Sol. Novocaini 1%-5 ml

D.t.d. N. 5 in ampull.

S. Для провідникової анестезії.

Rp.: Novocaini 0,5

Sol. Natrii chloridi 0,9% ad 100 ml

M. Sterilisetur!

D.S. Для інфільтраційної анестезії.

Rp.: Sol. Novocaini 0,25%-200 ml

Sterilisetur!

Adde asepticæ: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% gtts. XX

M.D.S. Для інфільтраційної анестезії.

Rp.: Sol. Lidocaini hydrochloridi 2%-10 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. Для провідникової анестезії.

Rp.: Sol. Lidocaini hydrochloridi 10%-2 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. Внутрішньом'язовою 2 мл.

Rp.: Asp. Anaesthesini 5%-20,0

D.S. Присипка для знеболювання.

Rp.: Anaesthesini 5,0

Talci ad 100,0

M. f. pulv. subtil.

D.S. Присипка для знеболювання.

- Rp.: Ung. Anaesthesini 5%-10,0
D.S. Наносити на шкіру при опіках.
- Rp.: Anaesthesini 5,0
Talci 30,0
Vaselini ad 100,0
M. f. pasta
D.S. Наносити на шкіру при опіках.
- Rp.: Anaesthesini 0,1
Ol. Cacao 3,0
M. f. supp. rect.
D.t.d. N. 10
S. По 1 свічці 2 рази на добу в задній прохід.
- Rp.: Sol. Tannini 0,5 %-1000 ml
D.S. Для промивання шлунку при отруєннях.
- Rp.: Sol. Tannini 0,5%-500 ml
D.S. Для полоскання.
- Rp.: Sol. Tannini 5%-50 ml
D.S. Для лікування опіків.
- Rp.: Ung. Mentholi 1%-10,0
D.S. Для змащування слизової оболонки носа.
- Rp.: Tab. Carbonis activati 0,5 N 10
D.S. По 1 табл. 3 рази на добу при метеоризмі.
- Rp.: Carbonis activati 20,0
D.S. По 10 г всередину при отруєнні.
- Rp.: Sol. Ammonii caustici 10%-30 ml
D.S. Змочити шматочок вати, піднести до носу хворого (для збудження дихання при запамороченні).
- Rp.: Sol. Ammonii caustici 10%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.

S. Внутрішньом'язово по 1 мл.

2. Засоби, що впливають на еферентну іннервацію

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 1%-5 ml

D.S. По 1 краплі в кожне око 2 рази на день.

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1%-10 ml

D.t.d. N.10 in ampull.

S. По 1 мл підшкірно під час ниркової кольки.

Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0,2%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл підшкірно.

Rp.: Aer. Ipratropinii bromidi 15 ml

D.S. По 2 вдиху 3 рази на день.

Rp.: Pirenzepini 0,05

D.t.d.N. 10 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Sol. Proserini 0,05%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл підшкірно.

Rp.: Tab. Proserini 0,015 N10

D.S. По 1 таб. 3 рази на добу.

Rp.: Sol. Galanthamini hydrobromidi 1%-1 ml

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. Внутрішньом'язово по 1 мл.

Rp.: Alloximi 0,075

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. Розчинити в 2 мл води для ін'єкцій уводити внутрішньом'язово.

Rp.: Sol. Pilocarpini hydrochloridi 1%-10ml

D.S. Очні краплі. По 1-2 краплі 2 рази на день у кожне око.

Rp.: Sol. Tubocuraroni hydrochloride 1%-1,5 ml

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. Внутрішньовенно по 1,5 мл.

Rp.: Sol. Dithylini 2%-10 ml

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. Внутрішньовенно по 5 - 10 мл.

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1%-1ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 0,5 мл підшкірно при анафілактичному шоці.

Rp.: Sol. Noradrenalini hydrotartratis 0,2%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. Розчинити в 5% розчині глюкози, вводити внутрішньовенно, крапельно (2 - 4 мл на 1л розчину) при колапсі.

Rp.: Sol. Mesatoni 1%-1 ml

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. Внутрішньом'язово по 1 мл.

Rp.: Mesatoni 0,03

Sacchari 0,3

M.f. pulvis

D.t.d.N. 10

S. По 1 порошку 2 рази на день.

Rp.: Sol. Anaprilini 0,1%-1ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Anaprilini 0,04

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Metoprololi 0,05

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

- Rp.: Metaprololi 0,1
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.
- Rp.: Aer. Salbutamoli 10 ml
D.S. Для інгаляцій під час приступу бронхіальної астми.
- Rp.: Fenoteroli 0,005 N 20
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.
- Rp.: Fenoteroli 10 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Внутрішньовенно краплинно на фізіологічному розчині.
- Rp.: Prazosini 0,001
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.
- Rp.: Aer. Izadrini 0,5%-25 ml
D.S. Для інгаляцій під час приступу бронхіальної астми.
- Rp.: Reserpini 0,0001
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

3. Засоби для наркозу. Снодійні. Протисудомні засоби

- Rp.: Sol. Ketamini 1%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово.
- Rp.: Sol. Natrii oxybutiratis 20%-10 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 10 мл довенно.
- Rp.: Zolpidemi 0,01
D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 2 рази на день.

Rp.: Natrii valproici 0,2

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Carbamazepini 0,2

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Nitrazepamі 0,005

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 2 рази на день.

Rp.: Phenobarbitali 0,1

D.t.d. N. 10 in tab.

S. По 1 табл. за 30 хв. Перед сном

Rp.: Levodopae 0,25

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

4. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики

Rp.: Sol. Morphini hydrochloridi 1%-1ml

D.t.d. N. 6 in ampull.

S. По 1 мл підшкірно.

Rp.: Tramadoli hydrochloridi 0,05

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. при болях після операційної травми

Rp.: Sol. Tramadoli hydrochloridi 5%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутришньом'язово.

Rp.: Sol. Promedoli 1%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутришньом'язово.

- Rp.: Sol. Promedoli 2%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово.
- Rp.: Naloxoni hydrochloridi 1ml (0,4 мг/мл)
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Вводити у вену по 1 мл при отруєнні наркотиками.
- Rp.: Acidi acetylsalicylici 0,5
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день після їди.
- Rp.: Analgini 0,5
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 2-3 рази на добу при невралгії трійчастого нерва.
- Rp.: Sol. Analgini 50%-2 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 2 мл внутрішньом'язово.
- Rp.: Sol. Diclofenaci natrii 2,5%-3 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово.
- Rp.: Diclofenaci natrii 0,025
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.
- Rp.: Paracetamoli 0,2
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. при головному болю
- Rp.: Paracetamoli 0,15
Ol. Cacao 3,0
M. f. supp. rect.
D.t.d. N. 10
S. По одному супозиторію в задній прохід при гіпертермії.
- Rp.: Celecoxibi 0,1
D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

5. Психотропні засоби

Rp.: Dr. Aminazini 0,025

D. t.d. N. 20

S. По 1 драже 2 рази на день.

Rp.: Sol. Aminazini 2,5%-1ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутришньом'язово.

Rp.: Sol. Droperidoli 0,25%-5ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутришньом'язово.

Rp.: Sol. Droperidoli 0,25%-10ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутришньом'язово.

Rp.: Phenazepamі 0,0005

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 2 рази на добу.

Rp.: Phenazepamі 0,001

D.t.d. N. 10 in tab.

S. По 1 табл. 2 рази на добу.

Rp.: Gidazepamі 0,01

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Tinct. Valerianae 30 ml

D.S. По 30 крапель 2 рази на добу.

Rp.: Sol. Coffeini-natrii benzoatis 10%-1ml

. D.t. d. N 10 in ampull.

S. По 1 мл 2 рази на день під шкіру.

Rp.: Amitryptilini 0,025

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Sol. Amitryptilini 1%-2 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 2 мл внутрим'язово.

Rp.: Fluoxetini 0,02
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D.t.d. N. 20 in caps.
S. По 1 капсулі 2 рази на день.

Rp.: Cordiamini 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл під шкіру при колапсі.

Rp.: Sol. Sulfocamphocaini 10%-2ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрим'язово.

Rp.: Sol. Aethimizoli 1%-3 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 3 мл в вену 2 рази на добу.

Rp.: Pyracetami 0,2
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 2 таб. 3 рази на день після їжі

Rp.: Sol. Pyracetami 20%-5 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 5 мл внутрим'язово при черепно-мозковій травмі.

6. Засоби, що впливають на функції органів дихання

Rp.: Theophyllini 0,3
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Ambroxoli 0,03
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Sir. Ambroxoli 0,3%-100 ml
D.S. По 2 чайні ложки сіропу 3 рази на добу.

Rp.: Acetylcysteini 0,2
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Sir. Acetylcysteini 0,75% – 100 ml
D.S. По 2 чайні ложки сіропу 3 рази на добу.

Rp.: Glaucini hydrochloridi 0,05
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

7. Кардіотонічні засоби

Rp.: Digoxini 0,00025
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Sol. Corglyconi 0,06%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Розчинити в 10-20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, вводити внутрішньовенно повільно 1 раз на день

Rp.: Dobutamini 0,25
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Внутрішньовенно на ізотонічному розчині натрію хлориду з розрахунку 10 мг/кг.

8. Антиангіральні засоби

Rp.: Sol. Nitroglycerini oleosae 0,0005
D.t.d.N. 20 in caps.
D. S. По 1 капсулі під язик (капсулу розчавити зубами).

Rp.: Isosorbide mononitrati 0,02
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Amlodipini 0,005
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Sol. Verapamili 0,25%-2 ml
D.t.d.N. 10 in ampull.
S. По 2 мл внутрішньовенно при пароксизмальній тахікардії.

Rp.: Verapamili 0,04
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази в день при тахіаритміях.

9. Гіпотензивні засоби. Гіполіпідемічні засоби. Ангіопротектори

Rp.: Losartani 0,1
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. на день.

Rp.: Enalaprili 0,01
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. на день.

Rp.: Lisinoprili 0,025
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. на день.

Rp.: Nifedipini 0,01
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Drotaverini 0,04
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Sol. Drotaverini 2%-2ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Lovastatini 0,01
D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. увечері під час їди

Rp.: Phenofibrati 0,1

D.t.d. N. 10 in caps.

S. По 1 капсулі 2 рази на день.

Rp.: Dr. Pentoxuphyllini 0,1 N 20

D.S. По 1 драже 3 рази на день.

Rp.: Sol. Pentoxuphyllini 2%-5 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25%-10ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 10 мл внутрішньом'язово при гіпертонічному кризі.

10. Засоби, що впливають на функцію органів травлення

Rp.: Metoclopramidi 0,001

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. на день.

Rp.: Sol. Metoclopramidi 0,01%-2 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Omeprazoli 0,02

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 2 табл. 1 раз на день уранці.

Rp.: Famotidini 0,02

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. на день.

Rp.: Almageli 170 ml

D.S. По 1 чайній ложці за 30 хв. До їди 4 рази на день.

Rp.: Pancreatini 0,5

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Contrycali 10000 OD

D.t.d. N. 5

S. Вміст флакону розчинити в 500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, вводити внутрішньовенно крапельно

Rp.: Contrycali 50000 OD

D.t.d. N. 10

S. Вміст флакону розчинити в ізотонічному розчині натрію хлориду, вводити внутрішньовенно.

Rp.: "Allocholum"

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 2 табл. 3 рази на день.

Rp.: Cholosasi 250 ml

D.S. По 1 десертній ложці 2-3 рази на день.

Rp.: Silibori 0,04

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Dr. Bisacodili 0,005 N 30

D.S. По 1-3 драже 1 раз на добу перед сном.

11. Засоби, що впливають на нирки та міометрій

Rp.: Hydrochlorthiazidi 0,025

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. на день.

Rp.: Furosemidi 0,04

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. уранці.

Rp.: Sol. Furosemidi 1%-2ml

D.t.d.N.10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньовенно.

Rp.: Spironolactoni 0,025

D.t.d. N. 40 in tab.

S. По 1 таб. 2 рази на день.

Rp.: Oxytocini 1 ml (5 ОД)

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. Внутрішньовенно крапельно в 400 мл 5% розчину глюкози.

12. Засоби, що впливають на систему крові

Rp.: Fercoveni 5 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 5 мл внутрішньовенно.

Rp.: Methyluracili 0,5

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 2 табл. 3 рази на день під час або після їди

Rp.: Sol. Cyanocobalamini 0,01%-1ml

D.t.d.N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово щоденно протягом 1 місяця.

Rp.: Heparini 5 ml (1 ml - 5000 OD)

D.t.d. N. 5

S. Внутрішньовенно крапельно 5000ОД на ізотонічному розчині натрію хлориду, далі по 5000ОД через 4 години внутрішньом'язово 2-3 дні. Перед відміною дозу знижувати поступово!

Rp.: Fraxiparini 0,3 ml

D.t.d. N. 10 in spritx-tubulis

S. По 0,3 мл 1 раз на добу в жирову тканину живота

Rp.: Neodicumarini 0,1

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Vikasoli 0,015

D.t.d. N. 25 in tab.

S. По I табл. 2 рази на день за 3 дні до операції.

Rp.: Sol. Vikasoli 1%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Sol. Acidi aminocapronici 5%-100 ml
D.t.d. N. 10
S. Внутрішньовенно крапельно по 50 крапель за 1 хвилину протягом 30 хв.

13. Вітамінні препарати

Rp.: Thiamini chloridi 0,002
Sacchari 0,2
M.f.pulv.
D.t.d. N. 20
S. По I порошку 3 рази на день.

Rp.: Sol. Thiamini chloridi 5%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По I мл внутрішньом'язово 1 раз на добу

Rp.: Sol. Acidi ascorbinici 5%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1-2 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу

Rp.: Acidi ascorbinici 0,05
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Sol. Acidi nicotinicici 1%-1ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл підшкірно 1 раз на добу.

Rp.: Rutini 0,02
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл 3 рази на день.

Rp.: Sol. Ergocalciferoli oleosae 0,125%-10ml
D.S. По 20 крапель 3 рази на день.

Rp.: Sol.Tocopheroli acetatis oleosae 50%-0,2ml
D.t.d. N. 20 in caps.gel.

S. По 1 капсулі 3 рази на день.

Rp.: Sol. Tocopheroli acetatis oleosae 10%-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу

Rp.: Sol. Retinoli acetatis oleosae 3,44%-10 ml

D.S. По 2 краплі 3 рази на добу.

14. Гормональні препарати

Rp.: Corticotropini 10 OD

D.t.d. N. 10

S. По 10 OD внутрішньом'язово.

Rp.: L-Thyroxini 0,05

D.t.d. N. 10 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Insulini 5 ml (\bar{a} 40 OD)

D.t.d.N. 5

S. По 10 ОД під шкіру 3 рази на день за 15 хвилин до прийому їжі.

Rp.: Glibenclamidi 0,005

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Metformini 0,5

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Prednisoloni 0,005

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 6 табл. на добу після їди (4 табл. - о 8⁰⁰, 2 табл. - о 12⁰⁰)

Rp.: Sol. Retabolili oleosae 5% -1 ml

D.t.d. N. 3 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово 1 раз на тиждень.

Rp.: Sol. Progesteroni oleosae 1%-1 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу

**15. Ферменти та інгібітори ферментів. Солі. Кислоти.
Луги. Плазмозамінники**

Rp.: Lidazi 64 УО
D.t.d. N. 5
S. Вміст флакону розчинити в 1 мл 0,5% розчину новокаїну, вводити під шкіру для зменшення контрактур.

Rp.: Sol. Natrii chloridi 10%-50 ml
D.S. Для лікування гнійних ран.

Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9%-200 ml
Sterilisetur!
D.S. Внутрішньовенно крапельно.

Rp.: Sol. Calcii chloridi 10%-10 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 10 мл внутрішньовенно повільно.

Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10%-10 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 10 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Calcii gluconatis 0,5
D.t.d. N. 40 in tab.
S. По 4 табл. у день перед їдою.

Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 4%-20 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 50-100 мл внутрішньовенно.

Rp.: "Asparcam"
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: "Panangin"
D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл 3 рази на день.

Rp.: Magnesii sulfatis 30,0

D.S. Прийняти одно- або дворазово, запиваючи 200 мл мінеральної води.

Rp.: Sol. Glucosi 5% - 400 ml

Sterilisetur!

D.S. Внутрішньовенно крапельно.

16. Протиалергічні засоби

Rp.: Sol. Dimedroli 1 %-1 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Dimedroli 0,05

D.t.d. N. 10 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Suprastini 0,025

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Sol. Suprastini 2,5%-2 ml

D.t.d. N. 10 in ampull.

S. По 2 мл внутрішньом'язово.

Rp.: Loratadini 0,01

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл 3 рази на день.

17. Антисептичні та дезінфікуючі засоби

Rp.: Sol. Chlorhexidini bigluconatis 20% - 500 ml

D.S. Для обробки рук хірурга.

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5% -10 ml

D.S. Для обробки малих поранень.

Rp.: Iodicerini 25 ml

- D.S. Для обробки малих поранень.
Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi dilutae 50 ml
D.S. Для обробки шкіри.
- Rp.: Sol. Kalii permanganatis 0,5%-100 ml
D.S. Для промивання ран.
- Rp.: Sol. Kalii permanganatis 0,1%-2000 ml
D.S. Для промивання шлунку.
- Rp.: Sol. Kalii permanganatis 5%-100 ml
D.S. Для змащування опікової поверхні шкіри.
- Rp.: Furacilini 0,02 ad usum externum
D.t.d. N. 10 in tab.
S. 1 табл. розчинити в 100 мл води. Для полоскання рота.
- Rp.: Viridis nitentis 1,0
Spiritus aethylici 70% 50 ml
M.D.S. Для змащування шкіри при піодермії.
- Rp.: Spiritus aethylici 40%-50 ml
D.S. Для компресів.
- Rp.: Spiritus aethylici 70%-50 ml
D.S. Для обробки рук хірурга.
- Rp.: Spiritus aethylici 90%-50 ml
D.S. Для дезинфекції інструментарію.
- Rp.: Sol. Aethonii 0,5%-50 ml
D.S. Для аплікації при стоматиті.

18. Антидоти

- Rp.: Sol. Unithioli 5%-5ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 10 мл внутрішньовенно.

19. Антибіотики. Протимікозні засоби

- Rp.: Benzylpenicillini-natrii 500000 ОД
D.t.d.N. 10
S. Розчинити в 2 мл води для ін'єкцій, вводити внутрішньом'язово через 4 години.
- Rp.: Bicillini - 5 1500000 OD
D.S. Вміст флакону розвести в 5 мл розчинника, що додається, вводити в/м 1 раз на місяць.
- Rp.: Amoxicillini 60 ml
D.S. По 2 чайні ложки 4 рази на день.
- Rp.: Ceftriaxonі 0,5
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Розчинити в 5 мл 0,5% розчину новокаїну, внутрішньом'язово 2 рази на день.
- Rp.: Doxycyclini hydrochloridi 0,1 in obductae
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.
- Rp.: Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 1 раз на день.
- Rp.: Amikacini sulfatis 0,1
D.t.d. N. 10
S. Розчинити в 5 мл 0,5% розчину новокаїну, внутрішньом'язово 2 рази на день.
- Rp.: Itraconazoli 0,1
D.t.d. N. 10 in caps.
S. По 1 капсулі 3 рази на день.

20. Синтетичні хіміотерапевтичні засоби

- Rp.: Ketoconazoli 0,2
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.

Rp.: Ciprofloxacini 0,5
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день не розжовувати.

Rp.: Sol. Ciprofloxacini 1%-10 ml
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. Внутрішньовенно крапельно, розчинивши в 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

21. Протитуберкульозні засоби. Противірусні засоби

Rp.: Isoniazidi 0,3
D.t.d. N. 30 in tab.
S. По 1 табл. 3 рази на день.

Rp.: Rifampicini 0,15
D. t. d. N. 20 in caps.
S. По 1 капсулі 3 рази на день до їди.

Rp.: Pirazinamidi 0,5
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.

Rp.: Ung. Acicloviri 3% - 10,0
D.S. Закладати за нижні повіки 2 рази на добу.

Rp.: Acicloviri 0,1
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Laferoni 1000000 MO
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. По 1000000 MO внутрішньом'язово 2 рази на добу.

Rp.: Laferoni 100000 MO
D.t.d. N. 10 in ampull.
S. 100000 MO розчинити в 2 мл кип'яченої води. Закапувати в кожний прохід носа 3 рази на добу.

Rp.: Azidotimidini 0,1
D.t.d. N. 20 in tab.
S. По 1 табл. 2 рази на день.

22. Протипротозойні засоби

Rp.: Chingamini 0,25

D.t.d. N. 10 in tab.

S. По 2 табл. 2 рази на день.

Rp.: Metronidazoli 0,5

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 4 рази на день.

Rp.: Metronidazoli 0,5

Ol. Cacao 4,0

M.f. supp. vag.

D.t.d. N. 10

S. По 1 супозиторію вагінально 2 рази на день

Rp.: Mebendazoli 0,1

D.t.d. N. 20 in tab.

S. По 1 табл. 2 рази на день.