

ФАКТОРИ РИЗИКУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА


У результаті обстеження групи дітей із синдромом Дауна виявлено декілька факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань у цієї категорії пацієнтів: наявність супутньої патології (вади серця, алергози, порушення обміну речовин, епісиндром, ОРВІ тощо); пізні прорізування зубів (умовно-керовані фактори); недостатній рівень обізнаності батьків щодо стоматологічного здоров'я їх дітей; відсутність належного гігієнічного уходу за порожниною рота дитини (біохімічний фактор ризику) тощо.

Кратність гігієнічних процедур у дітей із синдромом Дауна




Діти із синдромом Дауна віднесені до групи з високим ризиком розвитку стоматологічних захворювань. Для кожного з дітей, відповідно з отриманими даними, було розроблено індивідуальні програми профілактики.

Рівень гігієни порожнини рота дітей із синдромом Дауна (за Кузьміною Е.М., 2000)



Індекс плинності ротової рідини у дітей із синдромом Дауна (за Леусом П.А., Белясовою Л. В., 1995)



Іскоростенська О.В.
 Харківський національний медичний університет
 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології
 Завідувач кафедри, д. мед. н., професор Назарян Р. С.